


FitoScar[®]
Stryphnodendron adstringens
(Mart.) Coville - Extrato seco 50%

**A pomada escura 3 em 1:
cicatrizante, antimicrobiana e
anti-inflamatória²⁻⁵**

A única* pomada
cicatrizante que **restaura**
a pele em tratamento
de lesões na fase **de**
granulação^{1,2}



**ÚNICA COM
TANINOS⁶**

* <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=18992>



A pomada escura 3 em 1: **cicatrizante, antimicrobiana e anti-inflamatória**²⁻⁵

CICATRIZANTE^{2,3,5}

Estimula a cicatrização formando uma película protetora. Estimula a formação do tecido de granulação subjacente ao epitélio.

ANTIMICROBIANA²⁻⁴

Inibe enzimas de bactérias e fungos. Atividade antimicrobiana contra *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, entre outros.

ANTI-INFLAMATÓRIA^{2,3,7}

Estimula a neovascularização e diminui o edema da ferida.



FitoScar[®]

Stryphnodendron adstringens
(Mart.) Coville - Extrato seco 50%

Referências bibliográficas: **1.** Bula do produto Fitoscar. **2.** Minatel DG, Pereira MAS, Chiaratti TM, *et al.* Estudo clínico para validação da eficácia de pomada contendo barbatimão (*Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville)* na cicatrização de úlceras de decúbito. *Rev Bras Med.* 2010;67(7):250-6. **3.** Pellenz NLK, dos Santos AM, Arboit EL, *et al.* Uso do *Stryphnodendron adstringens* no tratamento de uma gástrica de Fournier: relato de caso. *Evidentia.* 2016;13:55-6. **4.** Fiori GML, Fachin AL, Correa VSC, *et al.* Antimicrobial activity and rates of tannins in *Stryphnodendron adstringens* Mart. accessions collected in the Brazilian cerrado. *American Journal of Plant Sciences.* 2013;4:2193-8. **5.** Panizza S, Rocha AB, Gecchi R, *et al.* *Stryphnodendron barbatiman* (Vellozo) Martius: teor em taninos na casca e sua propriedade cicatrizante. *Revista de Ciências Farmacêuticas.* 1998;10:101-6. **6.** Dados Close Up jan/2022. **7.** Lima JCS, Martins DTO, Junior PTS. Experimental evaluation of stem bark of *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville for anti-inflammatory activity. *Phytotherapy Research.* 1998;12:218-20.

FITOSCAR[®] *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville - Extrato seco 50%. FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES: Pomada de 60 mg/g. Caixa com uma bisnaga de 20 g ou 50 g. **USO TÓPICO. USO ADULTO. INDICAÇÕES:** Este medicamento é indicado como agente cicatrizante em vários tipos de lesões epiteliais. **CONTRAINDICAÇÕES:** Fitoscar[®] é contraindicado no caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; em caso de suspeita de osteomielite, artrite séptica ou celulite avançada; em feridas com indicação de desbridamento e na suspeita ou diagnóstico de septicemia e febre sem foco infeccioso evidente. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Deverá ser evitado contato do medicamento com os olhos. Fitoscar[®] não deve ser utilizado por outras vias que não a indicada. Não foram realizados estudos específicos para avaliação da segurança do Fitoscar[®] em pacientes com úlceras por pressão (categoria IV), nas quais existe necrose de tecido com comprometimento de ossos ou estruturas de suporte (tendão, cápsulas, etc.). **Gravidez e lactação:** A administração de Fitoscar[®] na gravidez ou durante o período de amamentação não é recomendada, exceto sob supervisão médica. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não há relatos de interações com outros medicamentos ou com alimentos, assim como não há relatos de interferência em exames laboratoriais. **REAÇÕES ADVERSAS:** Não foram relatadas reações adversas com o uso do produto nos estudos clínicos. As seguintes reações adversas foram relatadas no período pós-comercialização: ardência, dor, prurido, irritação e formação ou aumento do exsudato. Também poderá ser notada a alteração temporária na coloração (escurecimento da pele, principalmente no leito da ferida em tratamento, decorrente da absorção dos elementos presentes na composição de Fitoscar[®]). **POSOLOGIA:** O produto Fitoscar[®] é de uso tópico e deve ser aplicado 1 vez ao dia, em quantidade suficiente para cobrir toda a área lesada. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.** Reg. MS nº 1.0118.0605. **APSEN FARMACÊUTICA S.A.** Fitoscar[®]_V04.

CONTRAINDICAÇÕES: Fitoscar[®] é contraindicado em casos de hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula, feridas com indicação de desbridamento e na suspeita ou diagnóstico de septicemia. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não há relatos de interações com outros medicamentos ou com alimentos.



FitoScar[®]
Stryphnodendron adstringens
(Mart.) Coville - Extrato seco 50%



Material destinado exclusivamente a profissionais da saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
É proibida a reprodução ou transmissão parcial ou total do conteúdo deste material por qualquer meio, sem autorização prévia da Apsen Farmacêutica.

WV-02099 - Janeiro/2022.

